


BATTERIE VERSCHLUCKT?

→ BEFOLGEN SIE DIESE SCHRITTE!



SYMPTOME:

Atemwegsobstruktion oder Keuchen, Sabbern, Erbrechen, Beschwerden in der Brust, Schluckbeschwerden, verminderter Appetit, Nahrungsverweigerung, Husten, Ersticken

<6 JAHRE

HOCH-RISIKO PATIENTEN

1 **<2**
Zeit zum Handeln!
→ nicht auf Symptome warten



<12 Std.

(>1 Jahr) nach Verschlucken zur Überbrückung der Wartezeit 2 Esslöffel Honiggabe alle 10 min bis zu 6-mal



2
Unmittelbare endoskopische Entfernung

<12

Diagnostik: Röntgenbild von Thorax, Hals & Abdomen in 2 Ebenen bei längerer Vorgeschichte oder Verdacht auf Ösophagus Läsion, die >12 Std. zuvor entstand: CT vor endoskopischer Entfernung erwägen

3
Beurteilung der Risikofaktoren für Blutungen

Vorbereiten auf **Instabilität**

4
Stationäre Überwachung

Erwägen Sie Spülung mit 50 – 150 ml **0,25%-ige Essigsäure**, wenn nach der Entfernung keine Anzeichen von Perforation/Fistel bestehen

